

DENEY 1: BAZI KURUTULMUŞ GIDALARDAKİ KÜKÜRTDİOKSİT TAYİNİ-DENEYSEL VERİLER-TR

GR 1

Sodyum hidroksitin normalitesi: 0.25 N

Sodyum hidroksitin faktörü: 1,005

Sarfiyat: 1,2 ml

Tartılan kuru kayısı miktarı: 5,003 gr

GR 2

Sodyum hidroksitin normalitesi: 0.18 N

Sodyum hidroksitin faktörü: 1,005

Sarfiyat: 1,5 ml

Tartılan kuru kayısı miktarı: 5,134 gr

GR 3

Sodyum hidroksitin normalitesi: 0.15 N

Sodyum hidroksitin faktörü: 1,005

Sarfiyat: 2,4 ml

Tartılan kuru kayısı miktarı: 5,015 gr

GR 4

Sodyum hidroksitin normalitesi: 0.2 N

Sodyum hidroksitin faktörü: 1,005

Sarfiyat: 1,8 ml

Tartılan kuru kayısı miktarı: 5,020 gr

GR 5

Sodyum hidroksitin normalitesi: 0.22 N

Sodyum hidroksitin faktörü: 1,005

Sarfiyat: 1,6 ml

Tartılan kuru kayısı miktarı: 5,2 gr

GR 6

Sodyum hidroksitin normalitesi: 0.12 N

Sodyum hidroksitin faktörü: 1,005

Sarfiyat: 2,7 ml

Tartılan kuru kayısı miktarı: 5,6 gr

EXPERIMENT I: DETERMINATION OF SULFURDIOXIDE IN SOME DRIED FOODS- EXPERIMENTAL DATA

GR 7

Normality of sodium hydroxide: 0.1 N

Factor of sodium hydroxide: 1.005

Consumption: 4,2 ml

The amount of dried apricots weighed: 5,014 gr

GR 8

Normality of sodium hydroxide: 0.35 N

Factor of sodium hydroxide: 1.005

Consumption: 0,8 ml

The amount of dried apricots weighed: 4,99 gr

GR 9

Normality of sodium hydroxide: 0.18 N

Factor of sodium hydroxide: 1.005

Consumption: 2,1 ml

The amount of dried apricots weighed: 5,45 gr

GR 10

Normality of sodium hydroxide: 0.16 N

Factor of sodium hydroxide: 1.005

Consumption: 2,9 ml

The amount of dried apricots weighed: 5,158 gr

GR 11

Normality of sodium hydroxide: 0.2 N

Factor of sodium hydroxide: 1.005

Consumption: 3,1 ml

The amount of dried apricots weighed: 6,003 gr