


iki katlı İntegraller



xoy düzleminde bir c eğrisi ile sınırlı kapalı bir D bölgesinde tanımlı ve sürekli olan $z = f(x, y)$ fonksiyonunu gözönüne alalım.


D bölgesini, alanları ΔA_i ($i = 1, 2, \dots, n$) olan kısmi bölgelere ayırıp bu bölgelerden keyfî (x_i, y_i) noktaları secelim. Ve

$f(x_1, y_1) \cdot \Delta A_1 + f(x_2, y_2) \cdot \Delta A_2 + \dots + f(x_n, y_n) \cdot \Delta A_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i$ toplamını oluşturalım. Bu toplam, tabanı ΔA_i ve yüksekliği $f(x_i, y_i)$ olan silindirik elemanlarının hacimleri toplamıdır. ΔA_i alanlarının herbirinin sıfıra yaklaşması halinde bu toplamın limitine $z = f(x, y)$ fonksiyonunun D bölgesinde iki katlı integrali denir ve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \cdot \Delta A_i = \iint_D f(x, y) dA$$

($\Delta A_i \rightarrow 0$)

şeklinde gösterilir. Bu integralin değeri, D bölgesinin çevresi üzerinde üstten $z = f(x, y)$ ve alttan xoy-düzlemi ile sınırlı cismin hacmini verir. Bu limit D bölgesinin kısmi bölgelere bölünüş şekline ve (x_i, y_i)




noktalarının ΔA_i içindeki seçiliş şekline bağlı değildir. Eğer D bölgesi eksentlere paralel doğrularla kısmi bölgelere ayrılırsa, kısmi bölgeler birer dikdörtgen olur ve bu dikdörtgenlerin alanları $\Delta A_i = \Delta x_i \Delta y_i$ ve dolayısıyla

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \cdot \Delta x_i \Delta y_i = \iint_D f(x, y) dx dy$$

olur. D bölgesine integrasyon bölgesi denir.

Düzgün bölge: Eğer, D bölgesinin çevresi, eksenlere dik doğrularla en çok iki noktada kesiiliyorsa bölgeye düzgün bölge denir.

Dikdörtgenler üzerinde iki katlı integraller



D bölgesinin kenarları xy -düzlemindeki koordinat eksenlerine paralel olan bir dikdörtgensel bölge olduğunu $f(x, y)$ fonksiyonunun da bu bölge üzerinde sınırlı bir fonksiyon olduğunu gözönüne alalım. Eğer D bölgesi $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ şeklindeki (x, y) noktalarından oluşuprsa o zaman $[a, b]$ ve $[c, d]$ aralıklarının her birini


$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_i < \dots < x_m = b$$

$$c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_j < \dots < y_n = d \text{ şeklinde parçalayarak}$$

D bölgesinin küçük dikdörtgenlerden oluşan bir P parçalanışını oluşturabiliriz. P parçalanışı mn tane D_{ij} ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$) dikdörtgenlerinden oluşur. Dikdörtgenlerin her biri $x_{i-1} \leq x \leq x_i$, $y_{j-1} \leq y \leq y_j$

noktalarından oluşur. D_{ij} dikdörtgenin alanı $\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j$ ve diyagonal uzunluk

$$\text{diam}(D_{ij}) = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_j - y_{j-1})^2}$$



şeklinde dir. P parçalanışının normu $\|P\| = \max_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (\text{diam}(D_{ij}))$ dir. Her bir D_{ij} dikdörtgeninden bir


(x_{ij}^*, y_{ij}^*) noktası a olarak her bir parçalanıştaki dikdörtgene karşı gelen mn terimin toplamı olan

$$R(f, P) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A_{ij}$$

Riemann toplamını oluşturalım. Her bir D_{ij} dikdörtgenine karşılık gelen terim eğer $f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \geq 0$ ise tabanı D_{ij} ve yüksekliği $f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)$ 'ın değeri olan dikdörtgensel kutunun hacmidir.

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} R(f, P) = \iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

$\downarrow$
x'e göre
düzgün.



$\downarrow$
y'e göre
düzgün.

Teorem: (Fubini'nin 1. teoremi)


Eğer $f(x, y)$, $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ dikdörtgensel bölge üzerinde sürekli ise;

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy$$

dir.

NOT: D bölgesi üzerinde sürekli olan fonksiyonlar bu bölgede integrallenebilirler.


Ör D bölgesi $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ karesi olsun. $\iint_D (x^2 + y) dA$ integraline yaklaşık bir değer bulmak için bölgenin 4 tane küçük kareye parçalanışına karşılık gelen Riemann toplamını her birinin merkezindeki noktaları seçerek kullanırız.



$$f(x, y) = x^2 + y$$

$$R(f, P) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot \Delta A_{ij}$$

$$\begin{aligned} &= f(x_{11}^*, y_{11}^*) \cdot \Delta A_{11} + f(x_{12}^*, y_{12}^*) \cdot \Delta A_{12} + f(x_{21}^*, y_{21}^*) \cdot \Delta A_{21} + f(x_{22}^*, y_{22}^*) \cdot \Delta A_{22} \\ &= \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 + \frac{1}{4} \right] \cdot \frac{1}{4} + \left[\left(\frac{3}{4} \right)^2 + \frac{1}{4} \right] \cdot \frac{1}{4} + \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 + \frac{3}{4} \right] \cdot \frac{1}{4} + \left[\left(\frac{3}{4} \right)^2 + \frac{3}{4} \right] \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{5}{16} + \frac{13}{16} + \frac{13}{16} + \frac{21}{16} \right] = \frac{52}{64} = \frac{13}{16} \approx \iint_D (x^2 + y) dA \end{aligned}$$



x'e dik doğrularla bölgeyi tararsak; (x'e göre düzen)

$$\iint_D (x^2 + y) dA = \int_0^1 \left[\int_0^1 (x^2 + y) dy \right] dx = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 \right) dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$$

y'ye dik doğrularla bölgeyi tararsak; (y'ye göre düzen)

$$\iint_D (x^2 + y) dA = \int_0^1 \left[\int_0^1 (x^2 + y) dx \right] dy = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} + yx \Big|_0^1 \right) dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} + y \right) dy = \frac{y}{3} + \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$$

Ör: $D: 0 \leq x \leq 2$ } ve $f(x,y) = 100 - 6x^2y$ olduğuna göre $\iint_D f(x,y) dA = ?$
 $-1 \leq y \leq 2$


$$\iint_D (100 - 6x^2y) dA = \int_0^2 \int_{-1}^2 (100 - 6x^2y) dy dx = \int_0^2 \left(100y - \frac{6x^2y^2}{2} \right) \Big|_{-1}^2 dx = \int_0^2 [(200 - 12x^2) - (-100 - 3x^2)] dx$$

$$= \int_0^2 [300 - 9x^2] dx = 300x - 3x^3 \Big|_0^2 = 600 - 24 = 576$$

$$= \int_{-1}^2 \int_0^2 (100 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^2 \left[100x - 2x^3y \right]_0^2 dy = \int_{-1}^2 (200 - 16y) dy = 200y - 8y^2 \Big|_{-1}^2$$

$$= [400 - 32] - [-200 - 8] = 600 - 24 = 576$$

Genel Bölgeler Üzerinde İki Katlı İntegraller. (Dik kesitler kullanarak iki katlı integrali hesaplamak)



$$\widehat{KLM} : y_1(x)$$

$$\widehat{KNM} : y_2(x)$$

$$\widehat{NKL} = g_1(y)$$

$$\widehat{NML} = g_2(y)$$

$$R(f, P) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A_{ij}$$

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} R(f, P) = \iint_D f(x, y) dA$$

x'e dik doğrularla bölge taranır;
(x'e göre düzgün)

$$\iint_D f(x,y) dA = \int_a^b \int_{\widehat{KLM}}^{\widehat{KNM}} f(x,y) dy dx$$

$$= \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y) dy dx$$

y'ye dik doğrularla bölge taranır;
(y'ye göre düzgün)

$$\iint_D f(x,y) dA = \int_c^d \int_{\widehat{NKL}}^{\widehat{NML}} f(x,y) dx dy$$

$$= \int_c^d \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y) dx dy$$

Teorem: (Fubini'nin 2. teoremi)

$f(x,y)$ bir D bölgesi üzerinde sürekli olsun.

1) Eğer D bölgesi $\varphi_1(x)$ ve $\varphi_2(x)$ $[a,b]$ aralığında sürekli olmak üzere $a \leq x \leq b$, $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$ ile tanımlı ise;


$$\iint_D f(x,y) dA = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy \right] dx$$

2) Eğer D bölgesi $g_1(y)$ ve $g_2(y)$ $[c,d]$ aralığında sürekli olmak üzere $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$, $c \leq y \leq d$ ile tanımlı ise


$$\iint_D f(x,y) dA = \int_c^d \left[\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y) dx \right] dy$$

dir.


Düzgün bölge örnekleri




x'e göre bölge düzgündür.
y'ye göre de bölge düzgündür.



x'e göre düzgün bir bölge değildir.
y'ye göre düzgün bölgedir.



x'e göre düzgün bölge.
y'ye göre de düzgün bölge



x'e göre düzgün bölgedir.
y'ye göre düzgün bir bölge değildir.


$$\text{ör/ } I = \int_{-2}^1 \int_{y^2}^{2-y} dx dy$$

a) verildiği şekliyle hesaplayınız.

b) integrasyon sırasını değiştirerek integrali yeniden yazınız.

$$\begin{aligned} \text{a) } I &= \int_{-2}^1 \left[\int_{y^2}^{2-y} dx \right] dy = \int_{-2}^1 (x \Big|_{y^2}^{2-y}) dy = \int_{-2}^1 [2-y-y^2] dy \\ &= 2y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \Big|_{-2}^1 \\ &= \left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(-4 - 2 + \frac{8}{3} \right) \\ &= 8 - \frac{5}{6} - \frac{8}{3} = 8 - \frac{21}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

b) $y^2 \leq x \leq 2-y$
 $-2 \leq y \leq 1$




$$I = \int_{-2}^1 \int_{y^2}^{2-y} dx dy = \int_0^1 \int_{-y^2}^{\sqrt{x}} dy dx + \int_1^4 \int_{-\sqrt{x}}^{2-x} dy dx$$

$$I = \int_0^{2/3} \int_{2x}^{2-x} f(x,y) dy dx$$

$$0 \leq x \leq \frac{2}{3}$$

$$2x \leq y \leq 2-x$$

integralinde integrasyon sırası değiştirildiğinde elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir.



$$I = \int_0^{4/3} \int_0^{y/2} f(x,y) dx dy + \int_{4/3}^2 \int_0^{2-y} f(x,y) dx dy$$

a) $\int_0^{2/3} \int_{2y}^{2-y} f(x,y) dx dy$

b) $\int_0^{2/3} \int_0^{y/2} f(x,y) dx dy + \int_0^{4/3} \int_0^{2-y} f(x,y) dx dy$

c) $\int_0^{4/3} \int_0^{y/2} f(x,y) dx dy + \int_{4/3}^2 \int_0^{2-y} f(x,y) dx dy$

d) $\int_0^{2/3} \int_0^{y/2} f(x,y) dx dy + \int_{2/3}^2 \int_0^{2-y} f(x,y) dx dy$

e) $\int_0^{4/3} \int_{2-y}^{y/2} f(x,y) dx dy$

$$I = \int_0^{3/4} \int_{3x}^{3-x} f(x,y) dy dx$$


$$0 \leq x \leq \frac{3}{4}$$

$$3x \leq y \leq 3-x$$

$$3x = 3-x$$

$$4x = 3$$

$$x = \frac{3}{4}$$



$$I = \int_0^{9/4} \int_0^{y/3} f(x,y) dx dy + \int_{9/4}^3 \int_0^{3-y} f(x,y) dx dy$$

$$I = \int_0^{1/2} \int_x^{1-x} f(x,y) dy dx$$


$$0 \leq x \leq \frac{1}{2}$$

$$x \leq y \leq 1-x$$

$$x = 1-x$$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$



$$I = \int_0^{1/2} \int_0^y f(x,y) dx dy + \int_{1/2}^1 \int_0^{1-y} f(x,y) dx dy$$

$$I = \int_0^{4/5} \int_{4x}^{4-x} f(x,y) dy dx$$


$$0 \leq x \leq \frac{4}{5}$$

$$4x \leq y \leq 4-x$$

$$4x = 4-x$$

$$5x = 4$$

$$x = \frac{4}{5}$$



$$I = \int_0^{16/5} \int_0^{y/4} f(x,y) dx dy + \int_{16/5}^4 \int_0^{4-y} f(x,y) dx dy$$

$$I = \int_0^{\sqrt{2}} \int_{\frac{y^2}{2}}^{\sqrt{3-y^2}} f(x,y) dx dy$$

$$f(x,y) dx dy$$

integralinde integrasyon sırası değiştirildiğinde elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

$$0 \leq y \leq \sqrt{2}$$

$$\frac{y^2}{2} \leq x \leq \sqrt{3-y^2}$$

$$\frac{y^2}{2} = \sqrt{3-y^2}$$


$$\frac{y^4}{4} = 3-y^2$$

$$y^4 = 12 - 4y^2$$

$$y^4 + 4y^2 - 12 = 0$$

$$(y^2-2)(y^2+6) = 0$$

$$y^2 = 2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{2}$$



$$x = \frac{y^2}{2} \quad x^2 + y^2 = 3$$

$$I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{2x}} f(x,y) dy dx + \int_1^{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3-x^2}} f(x,y) dy dx$$

$$I = \int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y) dx dy$$

$$0 \leq y \leq 1$$

$$y^2 \leq x \leq \sqrt{2-y^2}$$

$$y^2 = \sqrt{2-y^2}$$


$$y^4 = 2-y^2$$

$$y^4 + y^2 - 2 = 0$$

$$(y^2-1)(y^2+2)=0$$

$$y^2=1$$

$$y=\pm 1$$



$$I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} f(x,y) dy dx + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x,y) dy dx$$

$$I = \int_0^{\sqrt{3}} \int_{\frac{y^2}{3}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y) dx dy$$

$$0 \leq y \leq \sqrt{3}$$

$$\frac{y^2}{3} \leq x \leq \sqrt{4-y^2}$$

$$\frac{y^4}{9} = 4-y^2$$

$$y^4 = -9y^2 + 36$$


$$y^4 + 9y^2 - 36 = 0$$

$$+12-3$$

$$(y^2+12)(y^2-3)=0$$

$$y^2=3$$

$$y=\pm\sqrt{3}$$



$$I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{3x}} f(x,y) dy dx + \int_1^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y) dy dx$$

$$I = \int_0^2 \int_{\frac{y^2}{4}}^{\sqrt{5-y^2}} f(x,y) dx dy$$

$$0 \leq y \leq 2$$

$$\frac{y^2}{4} \leq x \leq \sqrt{5-y^2}$$

$$\frac{y^2}{4} = \sqrt{5-y^2}$$


$$\frac{y^4}{16} = 5-y^2$$

$$y^4 + 16y^2 - 80 = 0$$

^
20-4

$$(y^2-4)(y^2+20) = 0$$

$$y = \pm 2$$



$$I = \int_0^1 \int_0^{2\sqrt{x}} f(x,y) dy dx + \int_1^{\sqrt{5}} \int_0^{\sqrt{5-x^2}} f(x,y) dy dx$$


$$\int_0^1 \int_{\frac{x^2}{9}}^x f(x,y) dy dx + \int_1^3 \int_{\frac{x^2}{9}}^1 f(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_y^{3\sqrt{y}} f(x,y) dx dy$$

$$0 \leq x \leq 1$$

$$\frac{x^2}{9} \leq y \leq x$$

$$1 \leq x \leq 3$$

$$\frac{x^2}{9} \leq y \leq 1$$



$$a) \int_0^1 \int_{\frac{y^2}{9}}^y f(x,y) dx dy + \int_1^3 \int_{\frac{y^2}{9}}^1 f(x,y) dx dy$$

$$b) \int_0^1 \int_y^{3\sqrt{y}} f(x,y) dx dy$$

$$c) \int_0^1 \int_{3\sqrt{y}}^y f(x,y) dx dy$$

$$d) \int_1^3 \int_x^{3\sqrt{x}} f(x,y) dx dy$$

$$e) \int_0^1 \int_y^{\frac{y^2}{9}} f(x,y) dx dy + \int_1^3 \int_1^{\frac{y^2}{9}} f(x,y) dx dy$$

$$\bullet \mathcal{I} = \int_0^1 \int_{\frac{x^2}{8}}^{2x} f(x,y) dy dx + \int_1^4 \int_{\frac{x^2}{8}}^2 f(x,y) dy dx$$


$$0 \leq x \leq 1$$

$$1 \leq x \leq 4$$

$$\frac{x^2}{8} \leq y \leq 2x$$

$$\frac{x^2}{8} \leq y \leq 2$$

$$\mathcal{I} = \int_0^2 \int_{\frac{y}{2}}^{2\sqrt{2}y} f(x,y) dx dy$$



$$\bullet \mathcal{I} = \int_0^1 \int_{\frac{x^2}{3}}^{3x} f(x,y) dy dx + \int_1^3 \int_{\frac{x^2}{3}}^3 f(x,y) dy dx$$


$$0 \leq x \leq 1$$

$$1 \leq x \leq 3$$

$$\frac{x^2}{3} \leq y \leq 3x$$

$$\frac{x^2}{3} \leq y \leq 3$$

$$\mathcal{I} = \int_0^3 \int_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{3}y} f(x,y) dx dy$$



$$I = \int_0^1 \int_{\frac{x^2}{4}}^{4x} f(x,y) dy dx + \int_1^4 \int_{\frac{x^2}{4}}^4 f(x,y) dy dx$$

$$0 \leq x \leq 1$$

$$\frac{x^2}{4} \leq y \leq 4x$$

$$1 \leq x \leq 4$$

$$\frac{x^2}{4} \leq y \leq 4$$

$$I = \int_0^4 \int_{\frac{y}{4}}^{2\sqrt{y}} f(x,y) dx dy$$

