


	YTÜ - Fen-Edebiyat Fakültesi, Sınav Soru ve Cevap Kağıdı				NOT TABLOSU					
					1. S		2. S		TOPLAM	
Adı Soyadı										
Öğrenci Numarası				Grup No	1, 2					
Bölümü						Sınav Tarihi		25.11.2020		
Dersin Adı		KLASİK EMT I I. ARA SINAV-1				Sınav Süresi	40 dak.	Sınav Yeri		
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı		Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN, Prof. Dr. Zeynel YALÇIN						İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.										

Bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

QUESTIONS

1.a) Quarter of a circle of radius R on zy plane has non uniform linear charge density given by $\lambda(\theta) = \lambda_0 \cos(\theta)$, where λ_0 is a constant. Find the electric field vector $\vec{E}$ on the x -axis.



1.b) Electrostatic potential of a charge distribution in spherical coordinates given as

$V(r, \phi) = -A \ln(r) - B \sin(\phi)$, where A and B are constants.

i) Find the corresponding electrostatic field vector $\vec{E}(r, \theta, \phi)$

ii) Is this a legitimate electric field?

iii) Find the charge q inside a sphere of radius R with the center at the origin.


	YTÜ - Fen-Edebiyat Fakültesi, Sınav Soru ve Cevap Kağıdı				NOT TABLOSU				
					1. S		2. S		TOPLAM
Adı Soyadı									
Öğrenci Numarası				Grup No	1, 2				
Bölümü						Sınav Tarihi		25.11.2020	
Dersin Adı		KLASİK EMT I I. ARA SINAV-1				Sınav Süresi	40 dak.	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı		Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN, Prof. Dr. Zeynel YALÇIN						İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.									

Bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu sayfaya uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.


QUESTIONS

Q 2. A square pipe with cross sectional dimensions $\pi \times \pi$, running parallel to the z -axis (from $-\infty$ to ∞), has three grounded metal sides, at $y = 0$, $x = 0$, and $x = \pi$. The fourth side, at $y = \pi$, is maintained at a specific potential $V_0(x) = \sin x + \sin 2x$. Find the potential inside the pipe that satisfies the boundary conditions below:

- i. $V(0, y) = 0$; ii. $V(\pi, y) = 0$;
- iii. $V(x, 0) = 0$; iv. $V(x, \pi) = V_0(x) = \sin x + \sin 2x$



Bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.



$$dq = \lambda dl$$

$$= \lambda_0 \cos \theta R d\theta$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq' \vec{r}}{r^2}$$

$$\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}' = x\hat{x} - (R\sin\theta\hat{y} + R\cos\theta\hat{z})$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\vec{r}}{(x^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq' \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda_0 \cos \theta R d\theta}{(x^2 + R^2)^{3/2}} (x\hat{x} - R\sin\theta\hat{y} - R\cos\theta\hat{z})$$

$$= \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \left\{ x \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta \hat{x} - R \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \hat{y} - R \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta \hat{z} \right\}$$

$$\cos \theta = u$$

$$-\sin \theta d\theta = du$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$= \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \left\{ x \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} + R \frac{\cos^2 \theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} - R \left(\frac{1}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right) \Big|_0^{\pi/2} \right\}$$

$$= \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \left\{ x\hat{x} - \frac{R}{2} \hat{y} - \frac{R}{4} \pi \hat{z} \right\}$$

1-b) $V(r, \phi) = -A \ln(r) - B \sin \phi$
 25/100
 Bireysel kullanımı dışında izin alınmadan kopya ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V(r, \phi) = - \left[\frac{\partial V}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\phi} \right]$$

$$= + \left[+ \frac{A}{r} \hat{r} + \frac{B}{r \sin \theta} \cos \phi \hat{\phi} \right] \Rightarrow \vec{E} = \left[\frac{A}{r} \hat{r} + \frac{B \cos \phi}{r \sin \theta} \hat{\phi} \right]$$

if $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ it is a legitimate field.

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{E} &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_{\phi}) - \frac{\partial E_{\theta}}{\partial \phi} \right] \hat{r} \\ &+ \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial E_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r E_{\phi}) \right] \hat{\theta} \\ &+ \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r E_{\theta}) - \frac{\partial E_r}{\partial \theta} \right] \hat{\phi} \\ &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{B \cos \phi}{r \sin \theta} \hat{r} - \frac{\partial}{\partial r} \frac{B \cos \phi}{r \sin \theta} \hat{\phi} \right] = 0 \end{aligned}$$

$\frac{B \sin \phi}{r \sin \theta} = \frac{B \sin \phi}{\sin \theta}$

$$q = \int \rho(r') d\tau' \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho(r)}{\epsilon_0} \Rightarrow \rho(r) = \epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 E_r + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta E_{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} E_{\phi}$$

$$= \frac{A}{r^2} - \frac{B \sin \phi}{r^2 \sin \theta}$$

$$q = \int \epsilon_0 \left[\frac{A}{r^2} - \frac{B \sin \phi}{r^2 \sin \theta} \right] r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

$$q = \epsilon_0 \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (A \sin \theta dr d\theta d\phi - B \sin \phi dr d\theta d\phi)$$

$$q = 4\pi \epsilon_0 A R$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \phi d\phi = 0$$

2 BCs I) $x=0 \quad V=0$ II) $x=\pi \quad V=0$
 III) $y=0 \quad V=0$ IV) $y=\pi \quad V=\sin x + \sin 2x$

50/100

Bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

$\nabla^2 V(x,y) = 0 \quad V(x,y) = X(x)Y(y)$

~~$\nabla^2 V(x,y) = 0$~~

$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0$

$X(x) = A \sin kx + B \cos kx$

$Y(y) = C e^{ky} + D e^{-ky}$

I. BC $\Rightarrow B=0$

II. BC $k\pi = n\pi \Rightarrow k=n=1, 2, 3, \dots$

III. BC $\Rightarrow C e^0 + D e^0 = 0 \Rightarrow C = -D$

$V(x,y) = A \sin nx (e^{ny} - e^{-ny}) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin nx (e^{ny} - e^{-ny})$

or $V(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin nx \sinh ny$

IV BC $\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin nx \sinh n\pi = \sin x + \sin 2x$

$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh n\pi \int_0^{\pi} \sin nx \sin n'x dx = \int_0^{\pi} \sin x \sin n'x dx + \int_0^{\pi} \sin 2x \sin n'x dx$
 $n=n' \Rightarrow \frac{\pi}{2}$
 solution exists only for $n'=1$
 exists only for $n'=2$

$n=n'=1$

$C_1 \sinh(\pi) \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 0 \Rightarrow C_1 = \frac{1}{\sinh \pi}$

$n=n'=2$

$C_2 \sinh(2\pi) \frac{\pi}{2} = 0 + \frac{\pi}{2} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{\sinh 2\pi}$

$C_2 = \frac{1}{\sinh 2\pi}$


$V(x,y) = \frac{1}{\sinh \pi} \sin x \sinh y + \frac{1}{\sinh 2\pi} \sin 2x \sinh 2y$

	YTÜ - Fen-Edebiyat Fakültesi FİZİK Bölümü				NOT TABLOSU				
					1. S		2. S		TOPLAM
Adı Soyadı									
Öğrenci Numarası				Grup No	1, 2				
Bölümü						Sınav Tarihi		16.11.2020	
Dersin Adı		Classical Electromagnetic Theory 1 2dn Midterm				Sınav Süresi	100 dak.	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı		Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN, Prof. Dr. Zeynel YALÇIN					İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.									

QUESTIONS


Q1. A sphere of radius R has the potential on its surface given by $V_0(\theta) = 2\cos^2\theta - \sin^2\theta$. Using the azimuthal symmetric solution of the Laplace equation in spherical coordinate:

- find the potential $V(r, \theta)$ inside $r \leq R$ and outside $r \geq R$ the sphere,
- find the surface charge density $\sigma(\theta)$ of the sphere,
- find the total charge of the sphere, and
- find the electric field inside $r \leq R$ and outside the sphere $r \geq R$.



Q2. A long insulating cylindrical shell of inner radius a and outer radius b with relative permittivity $\epsilon_r = 7$ has non uniform charge density given by $\rho = \frac{k}{s}$, where k is a constant.

- Find the electric displacement $\vec{D}$ and electric field $\vec{E}$ at the regions of $s < a$, $a < s < b$ and $b < s$.
- Find the bound charge densities (ρ_b , σ_b^{inner} , σ_b^{outer} , σ_b^{top} , σ_b^{bottom})
- Taking the potential zero at the central axis $V(s = 0) = 0$ find the potential on the outer surface of the material.



Bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

$$V(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta)$$

$$* r=0 \quad B_l=0 \quad (2) \quad V(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l \quad r \leq R$$

$$* r \rightarrow \infty \quad A_l=0 \quad (2) \quad V(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l r^{-(l+1)} P_l \quad r \geq R$$

$$* r=R \quad V_{r \leq R} = V_{r \geq R} \Rightarrow A_l R^l = B_l R^{-(l+1)} \quad (2)$$

$$* \text{at } r=R \quad V_0(R, \theta) = 2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 3 \cos^2 \theta - 1 = 2 P_2(\cos \theta)$$

$$3 \cos^2 \theta - 1 = \sum A_l R^l P_l \quad (2)$$

$$\int P_{l'} 2 P_2 d(\cos \theta) = \sum A_l R^l \int P_l P_{l'} d(\cos \theta)$$

if $l' \neq 2$ no solution

$$2 \int P_2 P_{l'} d(\cos \theta) = A_{l'} R^{l'} \int P_l P_{l'} d(\cos \theta)$$

$$l=l'=2$$

$$2 \frac{2}{2 \times 2 + 1} = A_{l'} \frac{R^{l'}}{2 \times 2 + 1} \Rightarrow A_2 = 2 R^2 \quad (3)$$

$$2 R^{-2} R^2 = B_2 R^{-3} \quad (3)$$

$$B_2 = 2 R^3 \quad (3)$$

$$V(r, \theta) = 2 R^{-2} r^2 P_2 = 2 \left(\frac{r}{R} \right)^2 (3 \cos^2 \theta - 1) \quad r \leq R \quad (3)$$

$$V(r, \theta) = 2 R^3 R^{-3} P_2 = \left(\frac{R}{r} \right)^3 (3 \cos^2 \theta - 1) \quad r \geq R \quad (3)$$

b)

$$\tau(\theta) = -\epsilon_0 \left(\frac{\partial V_{out}}{\partial n} - \frac{\partial V_{in}}{\partial n} \right) \Big|_{r=R}$$

Bireysel kullanımı dışında izn alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

$$= -\epsilon_0 \left(\frac{R^3(-3)}{r^4} - \frac{2r^2}{R^2} \right) \Big|_{r=R} (3\cos^2\theta - 1)$$

$$= -\epsilon_0 \left(-\frac{3R^3}{R^4} - \frac{2R}{R^2} \right) (3\cos^2\theta - 1)$$

$$\tau(\theta) = \frac{5\epsilon_0}{R} (3\cos^2\theta - 1) \quad (1)$$

c)

$$Q = \int \tau(\theta) d\theta = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{5\epsilon_0}{R} (3\cos^2\theta - 1) R^2 \sin\theta d\phi d\theta \quad (2)$$

$$= 5\epsilon_0 R \int_0^{2\pi} d\phi \left[\int_0^\pi 3\cos^2\theta \sin\theta d\theta - \int_0^\pi \sin\theta d\theta \right]$$

$\cos\theta = u$
 $-\sin\theta d\theta = du$

$$= 10\pi\epsilon_0 R \left[-\cos^3\theta + \cos\theta \right]_0^\pi = 0 \quad (2)$$

d)

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\frac{\partial V}{\partial r} \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\theta} - \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

$$r \leq R \quad \vec{E} = -\frac{2R}{r^2} (3\cos^2\theta - 1) \hat{r} - \frac{r}{R^2} (-6\cos\theta \sin\theta) \hat{\theta} \quad (2) \quad (3)$$

$$r \geq R \quad \vec{E} = +3\frac{R^3}{r^4} (3\cos^2\theta - 1) \hat{r} - \frac{R^3}{r^4} (-6\cos\theta \sin\theta) \hat{\theta} \quad (2) \quad (3)$$

a) 2L $\rho_s k a$ $q_f = 0$ $\vec{D} = 0$ $\vec{E} = 0$ (2)

$\rho_s k a$ $q_f = 0$ $\int_a^s \int_0^{2\pi} \int_0^l \frac{k}{s} s d\theta ds dz = 2\pi k l (s-a)$ (3)

Bireysel kullanımı dışında izin alınmadan kısımları ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.



Gaussian cylinder

$\oint \vec{D} \cdot d\vec{a} = q_f$
 $\int_0^l \int_0^{2\pi} \int_s^b \vec{D} \cdot d\vec{a}_1 + \int_0^l \int_0^{2\pi} \vec{D} \cdot d\vec{a}_2 + \int_0^l \int_s^b \vec{D} \cdot d\vec{a}_3$
 $= D 2\pi s l$
 $D 2\pi s l = 2\pi k l (s-a) \Rightarrow \vec{D} = \frac{k(s-a)}{s} \hat{s}$

$\vec{B} = k(1 - \frac{a}{s}) \hat{s}$ (4)
 $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r}$

$\vec{E} = \frac{k}{\epsilon_0} (1 - \frac{a}{s}) \hat{s}$ (3)

$s > b$

$q_f = \int_a^b \int_0^{2\pi} \int_0^l \frac{k}{s} s d\theta ds dz = 2\pi k l (b-a)$ (3)

$\oint \vec{D} \cdot d\vec{a} = \dots = D 2\pi s l = 2\pi k l (b-a) \Rightarrow \vec{D} = \frac{k(b-a)}{s} \hat{s}$ (4)

$\vec{E} = \frac{k(b-a)}{\epsilon_0 s} \hat{s}$ (3)

$$b) \quad \vec{r}_b = \vec{P} \cdot \hat{n} \quad \phi_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} \quad \vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E}$$

Bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

$$\vec{P} = k \left(1 - \frac{a}{s}\right) \hat{s} - \epsilon_0 \frac{k}{7\epsilon_0} \left(1 - \frac{a}{s}\right) \hat{s} = \frac{6}{7} k \left(1 - \frac{a}{s}\right) \hat{s} \quad (3)$$

$$\sigma_b^{s=a} = \frac{6}{7} k \left(1 - \frac{a}{a}\right) \hat{s} \cdot (-\hat{s}) = 0 \quad (2)$$

$$\sigma_b^{s=b} = \frac{6}{7} k \left(1 - \frac{a}{b}\right) \hat{s} \cdot \hat{s} = \frac{6}{7} k \left(1 - \frac{a}{b}\right) \quad (3)$$

$$\sigma_b^{top} = \frac{6}{7} k \left(1 - \frac{a}{s}\right) \hat{s} \cdot \hat{z} = 0 \quad (2)$$

$$\sigma_b^{bottom} = \frac{6}{7} k \left(1 - \frac{a}{s}\right) \hat{s} \cdot (-\hat{z}) = 0 \quad (2)$$

$$\phi_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left[s \left(\frac{6}{7} k \left(1 - \frac{a}{s}\right) \right) \right] = -\frac{6}{7} \frac{k}{s} \quad (4)$$

$$c) \quad V(s=0)=0 \Rightarrow \quad V(s=b) - \underbrace{V(s=a)}_0 = - \underbrace{\int_0^a \vec{E}(s < a) \cdot d\vec{s}}_0 \quad (2)$$


$$- \int_a^b \vec{E}(a < s < b) \cdot d\vec{s}$$

$$V(s=b) = - \int_a^b \vec{E}(s) \cdot d\vec{s} = - \int_a^b \frac{k}{7\epsilon_0} \left(1 - \frac{a}{s}\right) ds = - \frac{k}{7\epsilon_0} (b-a) + \frac{k a}{7\epsilon_0} \ln \frac{b}{a} \quad (4)$$

	YTÜ - Fen-Edebiyat Fakültesi FİZİK Bölümü				NOT TABLOSU				
					1. S	2.S	3.S	4. S	TOPLAM
Adı Soyadı									
Öğrenci Numarası		Grup No	1, 2						
Bölümü						Sınav Tarihi		30.12.2020	
Dersin Adı	Klasik EMT 3. ARA SINAVI					Sınav Süresi	120 dak.	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN, Prof. Dr. Zeynel YALÇIN						İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.									


QUESTIONS

Q 1. A spherical linear dielectric material with electric susceptibility χ_e and radius R has a total charge of Q with non uniform charge density given by $\rho = \frac{k}{r}$ where k is a constant.




- Find the electric displacement $\vec{D}$ inside ($r \leq R$) and outside ($r \geq R$) of the sphere.
- Using $\vec{D}$, find the electric field $\vec{E}$ inside ($r \leq R$) and outside ($r \geq R$) of the sphere.
- Find the energy of the sphere using $W = \frac{1}{2} \int \vec{D} \cdot \vec{E} d\tau$.

Q 2. A thin rod of length $2L$ with linear charge density $\lambda = \alpha y$, where $\alpha > 0$ is a constant, is placed on y -axis as shown in the figure




- Find the monopole and dipole moments of the rod.
- Find the approximate potential at point P. $V \cong V_{monopol} + V_{dipol}$

Q 3. A very long wire carrying a steady current I is bent into a shape given in the figure. Using Biot-Savart law find the magnetic field vector formed by the wire at the origin $\vec{B}_O$.




Q 4. A wire carrying a steady current I_2 consists of five straight parts (1, 2, 3, 4, and 5) and is placed next to a very long wire carrying a steady current I_1 as shown in the figure.

- Find the forces acting on each parts of wire I_2 due to long wire I_1 in terms of unit vectors.
- Find the total force acting on wire I_2 in terms of unit vectors.



1)



$$a) \oint \vec{D} \cdot d\vec{a} = q_{free} \quad r \leq R$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{a} = D 4\pi r^2$$

$$q_{free} = \int \rho d\tau = \int_0^r \frac{k}{r} 4\pi r^2 dr$$

$$D 4\pi r^2 = 2\pi k r^2 \quad q_{free} = 2\pi k r^2 \Rightarrow \boxed{\vec{D} = \frac{k}{2} \hat{r}} \quad r \leq R \quad (L_1)$$

$$r \geq R \quad \oint \vec{D} \cdot d\vec{a} = D 4\pi r^2 \quad q_{free} = \int_0^R \frac{k}{r} 4\pi r^2 dr$$

$$q_{free} = 2\pi k R^2 \Rightarrow D 4\pi r^2 = 2\pi k R^2$$

$$\boxed{\vec{D} = \frac{k R^2}{2 r^2} \hat{r}} \quad (L_1)$$

$$b) \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0(1+\chi_e)} \Rightarrow \textcircled{2} \vec{E} = \frac{k}{2\epsilon_0(1+\chi_e)} \hat{r} \quad r \leq R$$

$$\chi_e = 0 \quad \textcircled{2} \vec{E} = \frac{k R^2}{2\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad r > R$$

$$c) W = \frac{1}{2} \int_{\infty}^R \vec{D} \cdot \vec{E} d\tau = \frac{1}{2} \int_0^R \left(\frac{k}{2}\right)^2 \frac{1}{\epsilon_0(1+\chi_e)} 4\pi r^2 dr \quad (5)$$

$$+ \frac{1}{2} \int_R^{\infty} \left(\frac{k R^2}{2 r^2}\right)^2 \frac{1}{\epsilon_0} 4\pi r^2 dr$$

$$W = \frac{\pi k^2}{2\epsilon_0(1+\chi_e)} \frac{r^3}{3} \Big|_0^R + \frac{\pi k^2 R^4}{2\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r}\right) \Big|_R^{\infty} \quad (6)$$

$$W = \frac{\pi k^2 R^3}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{3(1+\chi_e)} + 1\right) = \frac{\pi k^2 R^3 (4+3\chi_e)}{6\epsilon_0(1+\chi_e)} \quad (2)$$

$$2). a) q = \int \lambda(r') dl' = \int_{-L}^L \alpha y dy = \alpha \frac{y^2}{2} \Big|_{-L}^L \quad (3)$$

Bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Üçüncü tüm hakları saklıdır.

$$q = \frac{\alpha}{2} (L^2 - (-L)^2) = 0 \quad \boxed{q = 0} \quad (3)$$

$$P_x = 0 \quad P_z = 0 \quad P_y = \int y \rho(r') d\tau' \quad (2)$$

$$P_y = \int y \lambda(y) dy = \int_{-L}^L y \alpha y dy = \alpha \frac{y^3}{3} \Big|_{-L}^L \quad (3)$$

$$P_y = \alpha \frac{1}{3} (L^3 - (-L)^3) = \frac{2\alpha L^3}{3} \quad (3)$$

$$\boxed{\vec{P} = \frac{2\alpha L^3}{3} \hat{y}} \quad (2)$$

$$b) V(\vec{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{r} + \frac{\vec{P} \cdot \hat{r}}{r^2} + \dots \right]$$

$$\hat{r} = \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \quad (5) \quad \vec{P} \cdot \hat{r} = \frac{2\alpha L^3 y}{3(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$V(\vec{r}) \approx \frac{\alpha L^3 y}{6(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\alpha L^3 y}{6(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad \text{or} \quad (5)$$

$$V(\vec{r}) = \frac{\alpha L r \cos\theta}{6r^3} = \frac{\alpha L \cos\theta}{6r^2} \quad \text{polar coordinates}$$

3)

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Bireysel kullanımı dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

$$d\vec{l} \times \hat{r} = dl \sin\theta (-\hat{k})$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl \sin\theta (-\hat{k})}{r^2}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{R}{\sin^2\theta} d\theta \sin\theta (-\hat{k})$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (-\cos\theta) \Big|_0^{\pi/2} (-\hat{k})$$

$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \hat{k} \quad (8)$$

$$\left. \begin{aligned} dl &= dy & \cot\theta &= -\frac{y}{R} \\ y &= -R \cot\theta \\ dy &= R \csc^2\theta d\theta = \frac{R}{\sin^2\theta} d\theta \\ \sin\theta &= \frac{R}{r} \Rightarrow r = \frac{R}{\sin\theta} \end{aligned} \right\}$$

$$-(\cos\frac{\pi}{2} - \cos 0)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l}_2 \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl_2 \sin\theta}{R^2} (-\hat{k})$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} R \int_0^{\pi/2} d\theta \hat{k} = -\frac{\mu_0 I}{8R} \hat{k}$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{8R} \hat{k} \quad (8) \quad \vec{B}_3 = 0 \quad (4)$$

$$\vec{B}_0 = -\frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right) \hat{k} \quad (5)$$

$$4) \vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} (-\hat{z})$$

Bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

$$① \vec{F}_1 = I_2 \vec{\ell}_1 \times \vec{B} = I_2 C \hat{y} \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} (-\hat{z})$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 C}{2\pi a} \hat{x}} \quad (4)$$

$$\begin{matrix} \hat{x} \\ \hat{y} \\ \hat{z} \end{matrix}$$

$$② \vec{F}_2 = I_2 \int d\vec{\ell}_2 \times \vec{B} = I_2 \int_a^{a+b} dx \hat{x} \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} (-\hat{z})$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \left| \frac{a+b}{a} \right| \hat{y}} \quad (5)$$

$$③ \vec{F}_3 = I_2 \vec{\ell}_3 \times \vec{B} = I_2 C \hat{y} \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b)} (-\hat{z})$$

$$\boxed{\vec{F}_3 = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 C}{2\pi(a+b)} \hat{x}} \quad (4)$$

$$dx < 0$$

$$④ \vec{F}_4 = I_2 \int d\vec{\ell}_4 \times \vec{B} = I_2 \int_{a+b}^a dx (+\hat{x}) \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} (-\hat{z}) \quad (4)$$

$$\vec{F}_4 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \left| \frac{a}{a+b} \right| \hat{y} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \left| \frac{a+b}{a} \right| \hat{y}$$

$$⑤ \boxed{\vec{F}_5 = \vec{F}_1 = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 C}{2\pi a} \hat{x}} \quad (4)$$

$$b) \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \vec{F}_5 = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 C}{\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2(a+b)} \right) \hat{x}$$

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 C}{\pi} \left(\frac{3a+2b}{2a(a+b)} \right) \hat{x}} \quad (4)$$